



Multivitamínico / Multimineral / Antioxidante.

Tabletas.

FÓRMULA

Cada tableta ovalada biconvexa recubierta contiene:

Vitamina A (como Acetato y Betacaroteno)	5000	IU
Vitamina C (como Ácido Ascórbico)	120	mg
Vitamina D (como Colecalciferol)	400	IU
Vitamina E (como dl-Alfa Tocoferol Acetato)	45	IU
Vitamina K (como Fitomenadiona)	60	mcg
Tiamina HCl (Vitamina B1)	4.5	mg
Riboflavina (Vitamina B2)	4.5	mg
Niacinamida (Vitamina B3)	30	mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCl)	3	mg
Folato (como Ácido Fólico)	600	mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	9	mcg
Biotina	450	mcg
Acido pantoténico (como Pantotenato de Calcio)	10	mg
Calcio (como Fosfato Dicálcico)	162	mg
Hierro (como Fumarato Ferroso)	7.5	mg
Fósforo (como Fosfato Dicálcico)	125	mg
Yodo (como Yoduro de Potasio)	150	mcg
Magnesio (como Óxido de Magnesio)	35	mg
Zinc (como Sulfato de Zinc)	10	mg
Selenio (como Selenio Aminoácido Quelado)	50	mcg
Cobre (como Óxido Cúprico)	1.5	mg
Manganeso (como Sulfato de Manganeso)	5	mg
Cromo (como Cromo Aminoácido Quelado)	25	mcg
Molibdeno (como Molibdeno Aminoácido Quelado)	50	mcg
Potasio (como Cloruro de Potasio)	15	mg
Cloruro (como Cloruro de Potasio)	13	mg
Colina (como Bitartrato de Colina)	30	mg
Inositol	30	mg
Extracto de Ginseng coreano (Normalizado al 10% de Ginsenosídeos)	30	mg
Luteína	300	mcg
Licopeno	500	mcg
Vanadio (como Vanadio Aminoácido Quelado)	10	mcg
Níquel (como Sulfato de Níquel)	5	mcg
Excipientes: c.s.p		

PROPIEDADES

Biovit® Premium es la combinación de vitaminas, minerales y antioxidantes para el manejo suplementario de estados carenciales por componentes de la fórmula. Es un suplemento nutricional destinado a pacientes adultos con incrementos en los requerimientos de vitaminas y micronutrientes necesarios para el desempeño adecuado de las funciones metabólicas. La presencia de ginseng coreano en esta fórmula, aporta marcadas acciones desfatigantes y anti estrés; al tiempo que la luteína contenida en este producto, facilita la prevención de lesiones oculares como cataratas y defectos refractivos.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Profilaxis y tratamiento de estados carenciales por deficiencias a componentes de la fórmula. Astenia, neurastenia, anemias, depresión, fatiga física y mental. Convalecencias quirúrgicas e infecciosas. Estados sexuales disfuncionales como disfunción eréctil masculina y disminución de la libido en ambos sexos. Profilaxis de estados orgánicos degenerativos. Prevención del déficit de vitaminas, minerales y oligoelementos en pacientes que no pueden recibir dieta adecuada. Profilaxis de ceguera por degeneración macular.

CONTRAINDICACIONES

Evitar su uso en las siguientes condiciones:

Alergia o antecedentes alérgicos o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Hipervitaminosis por vitamina A o D.

Disfunción renal o hepática.

Acumulación de hierro.

Hipercalcemia e hipercalcuria.

No debe tomarse junto con otros medicamentos que contengan vitamina A y/o vitamina D.

PRECAUCIONES GENERALES

Biovit® Premium contiene Ácido fólico, Vitamina B12 y hierro. Componentes que pueden enmascarar ciertas formas de anemia.

No está recomendado para el manejo de deficiencias nutricionales severas.

Use con cautela en pacientes epilépticos.

Pacientes con deterioro de las funciones renales y hepáticas.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se recomienda su uso en estas etapas.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS MUTAGENESIS TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD

No se han sido reportadas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

En casos raros, pudieran aparecer trastornos digestivos (p.ej. estreñimiento, diarrea y náuseas), que desaparecen en la mayoría de los casos sin tener que dejar de tomar el producto.

Muy raramente, se han comunicado reacciones alérgicas como erupción cutánea, asma, edema de piel y membranas mucosas y urticaria.

Si observa alguno de estos efectos adversos o cualquier otro no descrito en este inserto, consulte a su médico.

Uso en diabéticos: Esta fórmula no contiene azúcar. Puede ser consumida por pacientes diabéticos.

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO

Ninguna conocida.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

El consumo de este producto junto a anticoagulantes suele arterar los efectos terapéuticos de éstos. Si está tomando o planea tomar anticoagulantes, por favor consulte a su médico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

MODO DE USO

Se recomienda tomar junto a alimentos una (1) tableta por día, acompaña de abundante agua.

SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO

Si usted ha tomado por alguna circunstancia una dosis superior a la recomendada, o a consumido al mismo tiempo suplementos vitamínicos, consulte inmediatamente a su médico o centro de salud más cercano, indicando la cantidad utilizada.

Los síntomas por sobredosis de Vitamina D podrían ser:

Hipercalcemia, náuseas, vómitos, sed, polidipsia (sed excesiva), poliuria (volumen excesivo de orina) y estreñimiento.

Dosis elevadas de hierro pueden producir irritación gastrointestinal y dolor abdominal con náuseas y vómitos. Otros efectos gastrointestinales pueden incluir estreñimiento y diarrea.

PRESENTACIÓN

Caja con 30 tabletas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Almacene en un lugar fresco (entre 15° y 25°C), seco y protegido de la luz.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORMACIONES ADICIONALES

Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUEDE, S.R.L.

Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010

E-mail: dir.medica@suedfarma.com



Elaborado por
Arnet Pharmaceutical
Para:
Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana.
www.labsued.com

Rev.: 25/09/2013.

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.: 2013-0162

®Marca registrada.