



buclizín®

comprimidos
Estimulante del Apetito

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Buclizina 2 Hcl	25 mg
Lisina Hcl.....	200 mg
Cianocobalamina.....	100 mcg
Excipientes, c.s.p.....	1 comp.

DESCRIPCIÓN

La buclizina, la lisina y la cianocobalamina contenidas en Buclizín® ejercen acciones sinérgicas sobre los centros cerebrales histaminérgicos y apomorfínicos estimuladores del hambre, provocando mayor respuesta orexígena y, por vía de consecuencia mejor ingesta alimentaria.

INDICACIONES

Condiciones caracterizadas por falta de apetito y pérdida de peso.

CONTRAINDICACIONES

Embarazo, glaucoma, hiperplasia prostática.

PRECAUCIONES

Tome las debidas precauciones durante el manejo de maquinarias y el uso concomitante de Buclizín® con depresores del SNC como alcohol, antidepresivos y antihistamínicos, pues pudiera ocurrir somnolencia.

REACCIONES ADVERSAS

A menudo suele ocurrir somnolencia.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se recomienda, salvo que los beneficios superen los posibles riesgos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

Salvo cualquier otra recomendación del médico tratante, se recomienda: Dependiendo de la severidad del cuadro anoréxico, se recomienda un (1) comprimido al día, preferiblemente luego de la cena.

PRESENTACIÓN

Caja con 30 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Conserve en lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz. Venta bajo prescripción médica.

Informaciones adicionales:

Consulte la Dirección Médica de LABORATORIOS SUED, S.R.L.

Tel: 809-682-4344 / Fax: 809-686-1010

E. Mail: labsued.com

Elaborado por:



Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana
www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.: 2009-0592

® Marca registrada.

Rev. 28/11/2014