

(cefadroxilo + ambroxol)

cefadrox respiratorio

Cápsulas / Suspensión / Gotas

Antibiótico cefalosporínico / Mucoregulador.

COMPOSICIÓN

Cefadrox® Respiratorio Cápsulas:

Cada cápsula contiene:

Cefadroxilo 500 mg

Ambroxol..... 30 mg

Excipientes: c.s.p. 1 cápsula

Cefadrox® Respiratorio Suspensión:

Cada 5 mL (una cucharada) contienen:

Cefadroxilo..... 250 mg

Ambroxol..... 15 mg

Excipientes: c.s.p. 5 mL

Cefadrox® Respiratorio Gotas:

Cada 1 mL contiene:

Cefadroxilo 125 mg

Ambroxol HCl 7.5 mg

Excipientes: c.s.p. 1 mL

DESCRIPCIÓN

Cefadrox® Respiratorio es la asociación de cefadroxilo y ambroxol; el primero, una cefalosporina de primera generación para administración oral y el segundo, un mucolítico y expectorante que actúa disolviendo el moco y estimulando la actividad mucociliar, a la vez que incrementa el volumen de las secreciones bronquiales y reduce su viscosidad, facilitando así su expulsión.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones bacterianas de las vías respiratorias altas y bajas debidas a microorganismos sensibles al cefaclor y asociadas a impactación mucosa en las vías respiratorias.

Nota: El cefadroxilo ha mostrado ser efectivo en la erradicación del estreptococo de la orofaringe.

Microbiología: Pruebas in vitro demuestran que las cefalosporinas son bactericidas. Debido a la inhibición de la síntesis de la pared celular, cefadroxilo es activo contra los siguientes organismos in vitro:

- Streptococo betahemolítico.
- Estafilococo, incluyendo coagulasa-positivo, coagulasa-negativo y cepas productoras de penicilinas.
- Streptococcus pneumoniae.
- Escherichia coli.
- Proteus mirabilis.
- Klebsiella sp.
- Moraxella (Branhamella) catarrhalis.

Otras cepas de microorganismos gramnegativos sensibles son: H. influenzae, Salmonella sp y Shigella sp.

Nota: La mayoría de las cepas de enterococo (Streptococcus faecalis y S. faecium), son resistentes al cefadroxilo. No es activo contra todas las cepas de Enterobacter sp, P. morganii y P. vulgaris. No tiene actividad contra Pseudo-monas sp y Acinetobacter calcoaceticus (antes Mima-Herellea sp).

CONTRAINDICACIONES

Cefadrox® Respiratorio, está contraindicado en pacientes con conocida alergia a las cefalosporinas o penicilinas o a cualquier otro componente de la fórmula.

PRECAUCIONES

Cefadrox® Respiratorio debe usarse con precaución en presencia de insuficiencia renal (véase Dosis y vía de administración). Para aquellos pacientes que presentan insuficiencia renal o sospecha de la misma, se debe realizar una cuidadosa observación clínica, así como estudios de laboratorio, antes y durante la terapia.

El uso prolongado de Cefadrox® Respiratorio puede ocasionar el crecimiento de organismos no sensibles. Es esencial la cuidadosa observación del paciente, si ocurre una sobreinfección durante el tratamiento, debiéndose tomar las medidas pertinentes.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se recomienda su uso, salvo que los resultados superen los riesgos.

Lactancia: Cefadroxilo se distribuye en la leche materna y, por lo tanto, debe administrarse con precaución en las mujeres lactando.

Hipersensibilidad: Al igual que con otras cefalosporinas, se han observado reacciones alérgicas en forma de prurito, exantemas, urticaria y angioedema. Estas reacciones generalmente desaparecen al discontinuar el medicamento. Se ha reportado, muy raramente, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, enfermedad del suero y anafilaxia.

DOSIS

Administrar estos medicamentos con alimentos, puede ayudar a disminuir la acidez gastrointestinal causada ocasionalmente por uso de cefalosporinas orales.

Las dosis recomendadas son como se muestra a continuación:

Cefadrox® Respiratorio Cápsulas: La dosis recomendada es una cápsula cada 12 horas, por el tiempo que determine el médico tratante.

Cefadrox® Respiratorio Suspensión: Las dosis deben administrarse cada 12 horas.

Peso en kg	250 mg/4 mg/5 ml (dosificador de 5 ml)
5	¼ - ½ cucharadita
10	½ - 1 cucharadita
15	¾ - 1 ½
20	1 - 2 cucharaditas
>25	1 ¼ - 2 ½ cucharaditas

Cefadrox® Respiratorio Gotas: Las dosis deben administrarse cada 12 horas.

Lactantes hasta 1 año: Medio gotero cada 12 horas.

Niños de 1 a 18 meses: 1 gotero cada 12 horas.

Niños con 24 meses: 2 goteros cada 12 horas.

PRESENTACIONES

Cefadrox® Respiratorio Cápsulas: Caja con 30 cápsulas.

Cefadrox® Respiratorio Suspensión: Frasco con polvo para suspensión extemporánea de 75mL.

Cefadrox® Respiratorio Gotas: Frasco con polvo para suspensión extemporánea de 20mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Conserve en lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz.

Venta bajo prescripción médica.

Informaciones adicionales:

Consulte la Dirección Médica de LABORATORIOS SUED, S.R.L.

Tel: 809-682-4344 / Fax: 809-686-1010

E. Mail: labsued.com

Elaborado por:



Laboratorios Sued, S.R.L.

Santo Domingo,

República Dominicana.

www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.:

Cefadrox® Respiratorio Cápsulas: 2003-2629

Cefadrox® Respiratorio Suspensión: 2003-2630

Cefadrox® Respiratorio Gotas: 2006-0964

® Marca registrada.

Rev. 01/12/2014