



Antibiótico cefalosporínico.

#### COMPOSICIÓN

Cefadrox Cápsulas:

Cada cápsula contiene:

Cefadroxilo (monohidrato)..... 500 mg

Excipientes: c.s.p. .... 1 cápsula

Cefadrox Suspensión:

Cada 5 mL de suspensión contienen:

Cefadroxilo (monohidrato)..... 250 mg

Excipientes: c.s.p. .... 5 mL

Cefadrox Gotas:

Cada mL (1gotero) contiene:

Cefadroxilo (monohidrato)..... 125 mg

Excipientes, c.s.p. .... 1 mL

#### DESCRIPCIÓN

Cefadrox es un antibiótico semisintético del tipo cefalosporínico para administración oral; indicado en el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles al cefadroxilo.

#### PROPIEDADES

El cefadroxilo es un antibiótico cefalosporínico con actividad bactericida por medio de la inhibición en la síntesis de la pared celular bacteriana. Los siguientes organismos resultan muy susceptibles al cefadroxilo: estreptococos beta hemolíticos (=Streptococcus pyogenes), neumococos, estafilococos (coagulasa-positivos y negativos, también contra cepas productoras de penicilinas). Parcialmente susceptibles al cefadroxilo son Klebsiella, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Haemophilus influenzae, especies de Salmonella y de Shigella. No acusa ninguna actividad el cefadroxilo contra la mayoría de las cepas de Enterobacter, Proteus y Pseudomonas, así como Streptococcus faecalis.

#### INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Infecciones respiratorias altas y bajas: Otitis, sinusitis, amigdalitis, faringitis, bronquitis, neumonías y profilaxis de infecciones bacterianas del paciente con bronquiolitis.
- Infecciones de la piel y tejidos blandos: Furunculosis, piodermitis e impétigos.
- Infecciones del tracto genitourinario: Cistitis y uretritis.
- Infecciones abdominales y viscerales.

#### OTRAS INFECCIONES

Osteomielitis y artritis séptica. Las pruebas de sensibilidad a este antibiótico deberán realizarse en cultivos al inicio y durante la terapia antimicrobiana. Deben practicarse pruebas de función renal, cuando sea necesario y realizarse procedimientos quirúrgicos, cuando estén indicados. Cefadrox es efectivo en la erradicación del estreptococo presente en orofaringe, sin embargo, no disponemos de información sobre su eficacia en la profilaxis de fiebre reumática.

Nota: Únicamente la penicilina por vía intramuscular ha demostrado efectividad en la profilaxis de la fiebre reumática.

#### CONTRAINDICACIONES

Pacientes con antecedentes alérgicos a penicilinas y/o cefalosporinas.

#### USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

El uso de este medicamento durante los primeros 3 meses del embarazo y durante la lactancia, queda bajo estricto criterio facultativo.

#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

#### DOSIS

Cefadrox Cápsulas:

Una cápsula cada 12 horas, o según recomiende el médico.

Cefadrox Suspensión:

Adultos y niños con un peso mayor a 40 kg: Se recomienda 50 mg/kg de peso / día dividido en 2 dosis (cada 12 horas).

Cefadrox Gotas:

Salvo cualquier otra recomendación del médico tratante, la dosis recomendada es 25-50 mg/kg/día en dosis divididas (cada 12 horas), por un tiempo no menor a 7 días, o seguir las dosis del siguiente esquema:

| Peso en libras               | Edad en meses             | Dosis en mL                      |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Niños menores de 6 meses     | Por debajo de los 6 meses | Una (1) gota por cada kg de peso |
| Niños entre las 12 a 17 lbs. | 6-11 meses                | 1½ goteros                       |
| Niños entre 18-23 lbs.       | 12-23 meses               | 1½ a 2 goteros                   |

#### FRECUENCIA DE LAS DOSIS

Deberá administrarse este medicamento cada 12 horas.

#### PRESENTACIONES

Cefadrox Cápsulas: Caja con 30 cápsulas.

Cefadrox Suspensión: Frasco con polvo para suspensión extemporánea de 75 mL.

Cefadrox Gotas: Frasco con polvo para suspensión extemporánea de 20 mL.

#### LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.  
Conserve en lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz.  
Venta bajo prescripción médica.

#### Informaciones adicionales:

Consulte la Dirección Médica de LABORATORIOS SUEDE, S.R.L.

Tel: 809-682-4344 / Fax: 809-686-1010

E. Mail: labsued.com

Elaborado por:



**Laboratorios Sued, S.R.L.**  
Santo Domingo,  
República Dominicana.  
www.labsued.com

® Marca registrada.