

COMPOSICIÓN:

Cada 1 mL (un gotero lleno) contiene:
 Vitamina A (palmitato).....1,500 U.I.
 Vitamina D3.....400 U.I.
 Vitamina C.....50 mg
 Fluoruro de Sodio (Fluor).....0.5 mg
 Excipientes: c.s.p.



Indicaciones: Profilaxis y manejo de las deficiencias por vitaminas A, D, C y para fortalecer el sistema dentario en erupción.

Dosis: Salvo cualquier otra recomendación del médico tratante, dosificar de la siguiente manera:

Niños de 3 meses a 1 año: Medio gotero (0.5 mL) por día.

Nota: Crecivit Natal® puede ser administrado directamente en la boca del niño, mezclado con leche o jugos de frutas.

Presentación: Envase con 30 mL y gotero calibrado

COMPOSICIÓN:

Cada 1 mL (un gotero) contiene:
 Vitamina A 1,500 U.I.
 Vitamina D3400 U.I.
 Vitamina E5 U.I.
 Vitamina C40 mg
 Vitamina B1.....1mg
 Vitamina B21.2 mg
 Vitamina B61 mg
 Vitamina B12.....3 mg
 Nicotinamida.....16 mg
 Pantenol.....5 mg
 Biotina 0.15 mg
 Fluoruro de Sodio0.5 mg
 Lisina, Clorhidrato50 mg
 Excipientes, c.s.p.1mL



Indicaciones: Profilaxis y tratamiento de estados carenciales por deficiencia de ingredientes de la fórmula como anemias, desnutrición y condiciones infecciosas ligadas a inapetencia.

Contraindicaciones: Ninguna conocida.

Vía de administración: Oral.

Dosis: Salvo cualquier otra recomendación del médico tratante, se administrará como sigue:

Niños mayores de 1 año: 1 a 1 1/2 goteros por día.

Nota: Crecivit Gotas® puede ser administrado directamente en la boca del niño y/o mezclado con leche o jugos de frutas.

Presentación: Frasco con 30 mL y gotero calibrado.

COMPOSICIÓN:

Cada 5 mL de jarabe contienen:
 Lisina Hcl..... 200 mg
 L- Glutamina..... 2.5 mg
 Vitamina B12..... 10 mcg
 Vitamina A (palmitato).....1,250 UI
 Tiamina.....1.0 mg
 Riboflavina.....5 mg
 Piridoxina.....1.25 mg
 Acido ascórbico.....25 mg
 Vitamina D.....200 UI
 Vitamina E.....5 UI
 Nicotinamida.....10 mg
 Pantenol.....5mg
 Excipientes: c.s.p.



Indicaciones: Deficiencias vitamínicas por componentes de la fórmula, desnutrición, retardo del desarrollo pondero-estatural, ejercicios físicos, pérdida de apetito, fatiga física e intelectual, astenia durante la ancianidad; así como también, para el manejo de estados hipercatabólicos como son los post-infecciosos, post-quirúrgicos, oncológicos y las quemaduras.

Contraindicaciones: Embarazo e hipersensibilidad a componentes de la fórmula.

Reacciones Secundarias: A dosis habituales, Crecivit Jarabe® no induce reacciones secundarias.

Vía de Administración: Oral.

Dosis: Salvo cualquier otra indicación del médico tratante, las dosificaciones recomendadas son las siguientes:

Niños de 2 a 5 años: Media (1/2) cucharada una (1) vez por día.

Niños de 6 a 12 años: Una (1) a 1 1/2 cucharadas una (1) vez por día.

Niños mayores de 12 años y adultos: Dos (2) cucharadas una (1) vez por día.

Presentación: Frasco con 120 mL.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Conserve en un lugar fresco (entre 15° a 25° C), seco y protegido de la luz.



Laboratorios Sued, S.R.L.
 Santo Domingo,
 República Dominicana.
www.labsued.com

Reg. Ind. No.

Reg. San. No.

® Marca registrada