

desolín desolín-d

loratadina

Comprimidos / Jarabe
Antihistamínico no sedante

loratadina + pseudoefedrina

Jarabe
Antihistamínico no sedante / Descongestionante

COMPOSICIÓN

DESOLIN®:

	Comprimidos	Jarabe
Loratadina	10 mg	5 mg
Excipientes: c.s.p.	1 comp.	5 mL

DESOLIN® D:

Cada 5 mL de jarabe contienen:

Loratadina.....5 mg

Sulfato de Pseudoefedrina..... 60 mg

Excipientes: c.s.p.....5 mL

ACCIONES TERAPÉUTICAS

DESOLIN®: Un antihistamínico tricíclico potente de acción prolongada, no sedativo con actividad selectiva y antagonista sobre los receptores H1 periféricos de la histamina.

DESOLIN® D: Un antihistamínico tricíclico potente de acción prolongada, no sedativo con actividad selectiva y antagonista sobre los receptores H1 periféricos de la histamina y efectos descongestionantes de la mucosa del tracto respiratorio.

INDICACIONES

DESOLIN®

Manejo de los síntomas que acompañan a los estados alérgicos, rinitis alérgica (rinitis alérgicas estacionales, perenne, polinosis nasales, coriza, fiebre de heno), dermatosis alérgicas y prurito ocular.

DESOLIN® D

Manejo de los síntomas que acompañan a los estados alérgicos asociados a congestión de las vías respiratorias.

CONTRAINDICACIONES

DESOLIN® y DESOLIN® D están contraindicados durante el embarazo y en personas sensibles a los principios activos de las formulaciones.

PRECAUCIONES

Pacientes con menoscabo grave de la función renal o hepática.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Estos fármacos solamente se administrarán en estas etapas, si los beneficios superan los posibles riesgos potenciales.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No administre ninguno de estos fármacos con alcohol. Estudios clínicos controlados han reportado aumento en las concentraciones plasmáticas de loratadina y pseudoefedrina, luego del uso concomitante de ketoconazol, eritromicina o cimetidina.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN PRUEBAS DE LABORATORIO

El uso de DESOLIN® y DESOLIN® D debe suspenderse aproximadamente 48 horas antes de efectuar cualquier prueba cutánea, ya que éstos pueden alterar o interferir la reactividad dérmica del paciente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

POSOLÓGIA

DESOLIN® COMPRIMIDOS:

Adultos y niños mayores de 12 años: Un comprimido, una vez al día.

DESOLIN® JARABE:

Adultos y niños mayores de 12 años: 2 cucharaditas, una vez al día.

Niños de 2 a 12 años: Con peso corporal superior a 30 kg: Dos cucharaditas, una vez al día.

Niños con peso menor a 30 kg: Una cucharadita, una vez al día.

DESOLIN® D:

Adultos y niños mayores de 12 años: 2 cucharaditas, una vez al día.

Niños de 2 a 12 años: Con peso corporal > 30 kg: Dos cucharaditas, una vez al día.

Niños con peso menor a 30 kg: Una cucharadita, una vez al día.

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de sobredosis con uno de estos medicamentos, se aconseja contactar al servicio de urgencias médicas.

PRESENTACIONES

DESOLIN® COMPRIMIDOS: Caja con 10 comprimidos.

DESOLIN® JARABE: Frasco con 60 mL.

DESOLIN® D: Frasco con 60 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

MANTENGA ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Conserve en un lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz.

Venta bajo prescripción médica.

INFORMACIONES ADICIONALES:

Consulte la Dirección Médica de LABORATORIOS SUED, S.R.L.

Tel.: (809) 686-1150 / Fax.: (809) 686-1010

E. Mail: dir.medica@suedfarma.com

Elaborado:



Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana.
www.labsued.com

®Marca registrada.

Rev. 06/01/2015