



Hipoglucemiante oral.

COMPOSICION:

Cada capleta contiene:

Glimepirida.....	2 mg
Metformina.....	500 mg
Excipiente, c.b.p.	1 capleta

DESCRIPCIÓN: Es la combinación de un hipoglucemiante derivado sulfonilúrico (la glimepirida) que promueve el aumento de la secreción de insulina por parte de las células beta de los islotes pancreáticos y un hipoglucemiante biguanídico (la metformina) que actúa principalmente disminuyendo la resistencia a la insulina e incrementando la sensibilidad de las células a las acciones de ésta.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Diapride Forte® está indicado para el tratamiento del diabético tipo 2 asociado a los cambios de estilo de vida.

- Diabético tipo 2 de recién diagnóstico con resistencia a seguir adecuadamente los cambios de estilo de vida.
- Diabético tipo 2, obeso, con sobrepeso o peso normal, con fracaso al régimen dietético y sin tendencia a la cetosis.
- Diabético tipo 2, bajo terapia con dieta y falla a sulfonilureas con tendencia al aumento de peso.
- Diabético tipo 2 obeso, con sobrepeso o con peso normal, con dieta y sulfonilureas, con trastorno de lípidos secundario a la diabetes.
- Diabético tipo 2 bajo régimen dietético y con falla secundaria a las sulfonilureas o biguanidas.
- Diabético tipo 1 (insulino-dependiente) bajo régimen dietético e insulina, para reducir la dosis de esta última, jamás para sustituirla.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la glimepirida y/o metformina, así como a otras sulfonilureas o biguanidas; cetosis diabética; estados hipoglucémicos; insuficiencia hepática y/o renal severas; ingesta de bebidas alcohólicas y el uso durante el embarazo.

También esta contraindicado como sustituto de insulina en diabetes tipo I, pacientes en post-quirúrgicos y todas las condiciones que cursen o provoquen estados de hipoxia o estados hipermetabólicos como ocurre durante la edad avanzada, alteraciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, infecciones severas (bacteremias, septicemias, neumopatías), traumas, fiebre, deshidratación e insuficiencia suprarrenal o embarazo. En caso de estudios radiológicos que utilicen medios de contraste I.V., se recomienda suspender la administración del medicamento 48 horas antes de efectuar el estudio radiológico y reanudar su administración 48 horas después de haberlo terminado, a fin de prevenir una lactoacidosis.

PRECAUCIONES GENERALES: Conservar el apego a dieta, ejercicio e ingestión del medicamento son fundamentales para garantizar la eficacia de DIAPRIDE FORTE® para el control de la diabetes, así como evitar cuadros de hipoglucemia. La metformina es la biguanida con más bajo índice inductor de lactoacidosis (0.24 por cada 10,000 pacientes) y puede evitarse si se tiene en mente la dosis máxima por día y sus contraindicaciones. Ante la presencia de este cuadro se deberá suspender su administración y aplicar las medidas terapéuticas correctivas.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Estudios realizados, encaminados a la búsqueda de alteraciones en animales, no mostraron efectos ni alteraciones en éstos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS : DIAPRIDE FORTE®: preferentemente deberá ser administrado con el desayuno o con la ingesta principal del día. De requerirse 2 o más tabletas al día se repartirá en dos o tres tomas con los alimentos. Para establecer la dosis de mantenimiento, los ajustes de aumentos o disminuciones de la dosis se realizan cada 15 días y estarán basados en los resultados de las pruebas de laboratorio y la tolerancia. Una vez obtenido el control metabólico la eficacia debe ser evaluada con mediciones de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) cada 3 meses.

El uso de sulfonilurea con insulina permite la reducción de hasta un 30% en la dosis de insulina diaria necesaria para alcanzar la glucemia deseada.

La asociación de metformina e insulina permite la mejor utilización de esta última con la consecuente reducción de la dosis hasta en un 25%, por ello en la terapia combinada de insulina más sulfonilurea y metformina, los requerimientos de insulina serán más bajos que cuando se combina ésta con cualquiera de los fármacos por separado y se recomienda iniciar con dosis más bajas de insulina (menos 4 unidades). **Diabético tipo 2 con insuficiencia renal:** Reducir en 50% la dosis diaria normal de DIAPRIDE FORTE® y en la misma proporción se hará el aumento o disminución cada 15 días, previa determinación de glucemia y valoración del funcionamiento renal. **Insuficiencia hepática:** Dado que la glimepirida es extensamente metabolizada en el hígado, se sugiere en pacientes con insuficiencia leve, iniciar a la dosis de ½ capleta al día e ir incrementando cuidadosamente bajo un estricto control glucémico. En pacientes con insuficiencia hepática severa se debe evitar el uso de este producto.

En caso de sustitución de otro antidiabético oral: En caso de que el paciente esté siendo controlado con una sulfonilurea que no sea la clorpropamida, debe suspenderse 24 horas antes e iniciar la terapia con DIAPRIDE FORTE®; en caso de que el paciente esté usando clorpropamida, suspenderla y esperar 48 horas antes de administrar DIAPRIDE FORTE®.

PRESENTACIÓN:

Caja con 100 capletas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz.
Venta bajo prescripción médica.

Informaciones adicionales:

Consulte la Dirección Médica de LABORATORIOS SUED, S.R.L.

Tel: 809-682-4344 / Fax: 809-686-1010

E. Mail: labsued.com

Elaborado por:



Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana.
www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.: 2005-1671

® Marca Registrada.

Rev.: 01/12/2014.