

# DOLOMETAPLEX®

Diclofenac Sódico / Tiamina Clorhidrato | **Comprimidos**  
Piridoxina Clorhidrato / Cianocobalamina

*Anti-inflamatorio / Analgésico / Neurotrópo.*

## COMPOSICIÓN

Cada comprimido de DOLOMETAPLEX® contiene:

Diclofenac sódico.....75 mg  
Clorhidrato de tiamina (vitamina B1).....50 mg  
Clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).....100 mg  
Cianocobalamina (vitamina B12).....1 mg  
Excipientes: c.s.p.....1 comprimido

## INDICACIONES TERAPÉUTICAS

El Diclofenac Sódico y las vitaminas del complejo B presentes en la fórmula, permiten un manejo racional de estados dolorosos en los que se sospeche o compruebe alguna etiopatogenia neuropática: Lumbalgias, cervicalgias, braquialgias, radiculitis, neuropatías periféricas de diversa etiopatogenia (neuralgias faciales, neuralgia del trigémino, neuralgia intercostal, neuralgia herpética, neuropatía post-alcohólica, neuropatía diabética); así como también, en el síndrome del canal del carpo, fibromialgias, espondilitis, dolores secundarios a traumas y cirugías..

## LAS VITAMINAS PRESENTES EN DOLOMETAPLEX®

La presencia de las vitaminas B1, B6 y B12 contenidas en esta formulación actúan sobre muchos mecanismos metabólicos; más sin embargo, su actividad predominante la ejercen sobre las neuronas y sobre la transmisión de sus impulsos, razón por lo que se ha dado en llamar vitaminas neurotrópicas.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, policitemia vera, Enfermedad temprana de Leber, gastritis, úlcus gastroduodenal, pacientes con antecedentes alérgicos al ácido acetil salicílico y sus derivados, discrasias sanguíneas, hemorragias e insuficiencia renal y hepática.

## RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No administre este producto durante el embarazo y/o la lactancia.

## REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Algunos pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico o sus derivados, pueden presentar alergia cruzada al Diclofenac. En raras ocasiones, han sido reportadas la ocurrencia de alergias a la Tiamina y a la Cianocobalamina, razones por las que deberá observarse especial cuidado en personas con antecedentes de este tipo.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

Antes de iniciar la terapéutica con DOLOMETAPLEX® en combinación con algún otro fármaco, el médico deberá ponderar las posibles interacciones medicamentosas propias de la combinación.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

## DOSIS

Niños mayores de 12 años: medio ( ½ ) a un (1) comprimido de DOLOMETAPLEX® cada 12 horas, o según considere el médico tratante.

Adultos: Uno a dos comprimidos de DOLOMETAPLEX® cada 8 horas, o según considere el médico tratante.

## PRESENTACIONES

Cajas con 10 y 100 comprimidos.

## LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

*Producto medicinal.*

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Conserve en lugar fresco (entre los 20 a 25°C), seco y protegido de la luz. Su venta requiere prescripción médica.

Elaborado por:



**Laboratorios Sued, S.R.L.**  
Santo Domingo,  
República Dominicana.  
[www.labsued.com](http://www.labsued.com)

Reg. Ind. No.

Reg. San. No.

® Marca registrada