



Evaxgín® óvulos

Metronidazol / Miconazol / Centella Asiática /
Neomicina / Polimixina B

Tricomoniásico | Antimicótico | Cicatrizante | Antiinflamatorio | Antibacteriano

Composición	óvulos
Metronidazol	400 mg
Nitrato de Miconazol	100 mg
Centella Asiática	15 mg
Neomicina Sulfato (equivalente a 42.0 mg de la base)	60 mg
Polimixina B Sulfato (equivalente a 64,000 UI)	6.4 mg
Excipientes, c.s.p.	1 óvulo

INDICACIONES

Tratamiento local de las vulvovaginitis inespecíficas y específicas, asociadas a lesiones de la mucosa vaginal y causadas por distintos microorganismos: tricomonas, hongos, bacterias asociadas a estados inflamatorios vulvovaginales. Disbacteriosis por cambios en el pH vaginal. Vaginosis bacteriana.

CONTRAINDICIONES

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto o a derivados imidazólicos.

- Primer trimestre del embarazo.
- Lactancia.
- Discrasias sanguíneas
- Epilepsia u otra enfermedad activa del Sistema Nervioso Central.

ADVERTENCIAS

Este producto no evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Los componentes usados pueden alterar diafragmas y preservativos al reaccionar con el látex. Se debe advertir a las pacientes que deben evitar la ingesta de alcohol durante el tratamiento y las 48 horas posteriores a la finalización. En pacientes con tricomoniasis se debe realizar tratamiento simultáneo de la pareja por la vía oral. No realizar lavados vaginales o usar duchas o tampones durante el tratamiento.

EFFECTOS ADVERSOS

No se describen reacciones adversas serias luego de la administración vaginal de los componentes de Evaxgín®. Basado principalmente en la presencia de metronidazol se describen las siguientes: Ocasionalmente (frecuencia > al 1%) se observó cefalea, prurito, dolor abdominal, náuseas, dismenorrea, rash, ardor vulvovaginal, diarrea, mastalgia, metrorragia. Rara vez (frecuencia < al 1%): Generales: reacción alérgica, dolor lumbar, síndrome gripal. Gastroenterológicas : anorexia, constipación, dispepsia, flatulencia, gingivitis, vómitos. SNC: depresión, vértigos, insomnio Respiratorias: asma, rinitis. Piel y anexos: acné, sudoración, urticaria. Urogenitales: disuria, edema labial, leucorrea, menorragia, pielonefritis, salpingitis, polaquiriuria, infección urinaria, vaginitis.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Basado en la presencia de metronidazol y a su absorción por vía vaginal, pueden presentarse interacciones con otros medicamentos durante el uso simultáneo de:

- Alcohol: reacciones tipo disulfiram.
- Anticoagulantes orales: aumento del efecto anticoagulante.
- Fenitoína: aumento de las concentraciones de fenitoína y disminución de las concentraciones sanguíneas de metronidazol.
- Fenobarbital: disminución de las concentraciones sanguíneas de metronidazol.
- Litio: aumento de las concentraciones de litio y de su toxicidad.

MECANISMO DE ACCIÓN

En Evaxgín®, se combinan la acción cicatrizante, regeneradora y protectora de tejido de la centella asiática, con la eficacia antiinfecciosa de los restantes principios activos, a nivel de la mucosa vulvovaginal. La centella asiática estimula el proceso de granulación y promueve una adecuada epitelización, la neomicina y la polimixina cubren un amplio espectro bacteriano, actuando sobre gérmenes gram positivos y gram negativos, el miconazol aporta su acción antimicótica y el metronidazol su acción tricomonocida, giardicida y amebicida.

SOBREDOSIS

No hay experiencia de sobredosis por vía vaginal en humanos. En caso de producirse absorción de metronidazol podría aparecer efectos sistémicos como: náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, prurito, sabor metálico, ataxia, vértigo, parestesias, convulsiones, leucopenia y orina oscura. Los síntomas de sobredosis por miconazol consisten en: náuseas, vómitos, irritación bucal, anorexia, cefaleas y diarrea. Ante la eventualidad de una sobredosificación acudir al centro médico más cercano.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vaginal.

POSOLOGÍA

Un óvulo por noche durante 6 días.
El médico determinará la prolongación o no del tratamiento.

PRESENTACIÓN

Evaxgín® óvulos: Caja conteniendo 6 ó 12 óvulos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Usar bajo prescripción médica.
Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conservar este producto a una temperatura inferior a los 22°C. En caso de ser necesario, puede refrigerarse.

INFORMACIONES ADICIONALES

Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUEDE, S.R.L.
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010
www.labsued.com

Reg. Ind. No.18055.
Reg. San. No.:

Elaborado por:
Laboratorios Sued, S.R.L.
Carretera La Isabela, Pantoja,
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 847
www.labsued.com

®Marca registrada