



FLENEX

Diclofenac sódico/Tiamina Clorhidrato
Piridoxina Clorhidrato/Cianocobalamina

Analgésico / Neurotropo

Composición	Comprimido
Diclofenac sódico	75 mg
Tiamina Clorhidrato (vit. B1)	50 mg
Piridoxina Clorhidrato (vit. B6)	100 mg
Cianocobalamina (vit. B12)	1 mg
Excipientes, c.s.p.	1 comprimido

INDICACIONES

El Diclofenac Sódico contenido en este producto ofrece analgesia y efectos anti-inflamatorios; además, las vitaminas presentes en la fórmula, permiten un manejo racional de estados dolorosos en los que se sospeche o compruebe alguna etiopatogenia neuropática: lumbalgias, cervicalgias, braquialgias, radiculitis, neuropatías periféricas de diversa etiología (neuralgias faciales, neuralgia del trigémino, neuralgia intercostal, neuralgia herpética, neuropatía post-alcohólica, neuropatía diabética); así como también, en el síndrome del canal del carpo, fibromialgia, espondilitis, dolores secundarios a traumas y cirugías.

VITAMINAS B1, B6 Y B12

Las vitaminas B1, B6 y B12 actúan sobre muchos mecanismos metabólicos; sin embargo, sus actividades predominantes las ejercen sobre las neuronas y sobre la transmisión de sus impulsos nerviosos, razones por lo que se les conoce como vitaminas neurotropas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a componentes de la fórmula, policitemia vera, enfermedad temprana de Leber, gastritis, ulcus gastroduodenal, pacientes con antecedentes alérgicos al ácido acetil salicílico y sus derivados, discrasias sanguíneas, hemorragias, insuficiencia renal y/o hepática.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Contraindicado su uso durante estas etapas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Algunos pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico o sus derivados, pueden presentar alergia cruzada al Diclofenac. En raras ocasiones han sido reportadas la ocurrencia de alergias a la Tiamina y a la Cianocobalamina, razones por las que deberá observarse especial cuidado en personas con antecedentes de este tipo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

Antes de iniciar el uso de este medicamento en combinación con algún otro fármaco, el médico deberá ponderar las posibles interacciones medicamentosas propias de cada sustancia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

Adultos: Un (1) comprimido de cada 12 horas, o según considere el médico tratante.

PRESENTACIONES

Caja con 10 comprimidos.

Caja con 100 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Su venta requiere prescripción médica.

Conserve en lugar fresco (entre los 15° a 30°C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES

Consulte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S. R.L.

Tel.: (809) 686-1150 / fax: (809) 686-1010

E. Mail: dir.medica@suedfarma.com

www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.: 2005-0468



Elaborado por:
Laboratorios Sued, S.R.L.
Carretera La Isabela, Pantoja,
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 847
www.labsued.com

© Marca registrada.