



Gastop

(Simeticona)

Cápsulas / Suspensión / Gotas

Antiflatulento.

Composición	Cápsula	Suspensión	Gotas
Simeticona	200 mg	200 mg	40 mg
Excipientes, c.s.p.	1 cápsula	5 mL	1 mL

PROPIEDADES

La simeticona es una sustancia inerte, desprovista de acción sistémica y que desarrolla un efecto espumolítico o antiflatulento, mediante acciones tensioactivas, disminuyendo la tensión superficial de las burbujas de gas y aire localizadas en el tracto gastrointestinal; con lo cual se produce rompimiento de las burbujas de gas presentes en el intestino, produciendo así eructos y liberación de los gases por vía rectal.

INDICACIONES

Profilaxis y tratamiento de la flatulencia y de los cólicos, secundarios a la presencia excesiva de gases en el intestino. Además, para disminuir la presencia de gases en el tracto gastrointestinal antes de proceder a estudios sono-radio-gráficos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIFICACIONES:

Gastop® cápsulas:

- Adultos y niños mayores de 12 años: Una cápsula luego de los alimentos.
- En la preparación del paciente para estudios sono-radiográficos o endoscópicos, las dosis quedan bajo criterio del médico tratante.

Gastop® suspensión:

- Niños de 2 a 6 años: 2.5 mL (½ cucharada), luego de las comidas principales y al tiempo de dormir por las noches.
- Niños de 7 a 12 años: 5 mL (1 cucharada), luego de las comidas principales y al tiempo de dormir por las noches.
- Adultos: Una a dos cucharadas, luego de las comidas principales y antes de acostarse a dormir por las noches.

Gastop® Gotas

- Niños menores de 2 años: 0.5 mL (½ gotero) 3 a 4 veces al día luego de los alimentos y al tiempo de dormir por las noches..
- Niños mayores de 2 años: 1 mL (1 gotero) luego de los alimentos y al tiempo de dormir por las noches.

PRESENTACIONES

Gastop® cápsulas: Caja con 30 cápsulas.

Gastop® suspensión: Frasco con 120 mL.

Gastop® Gotas Gotas Frasco de 30 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Venta bajo prescripción médica.

Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la luz.



Elaborado por:
Laboratorios Sued, S.R.L.
Carretera La Isabela, Pantoja,
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 847
www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Regs. Sans. Nos.:

Gastop® cápsulas:

Gastop® suspensión:

Gastop® Gotas: 2004-1389

® Marca registrada