



olmesar

Olmesartán medoxomilo 20 y 40 mg
Comprimidos

Antihipertensivo BRASs.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
Olmesartán medoxomilo 20 ó 40 mg
Excipientes: c.s.p.

DESCRIPCIÓN

Un antihipertensivo perteneciente al grupo de fármacos del tipo Antagonista de los Receptores de Angiotensina (BRASs por sus siglas en inglés) con acciones específicas sobre los receptores AT1 de la angiotensina II, el cual posee demostradas acciones antihipertensivas en el tratamiento de la hipertensión en sus diversas gradaciones.

ACCIONES TERAPÉUTICAS

El olmesartán bloquea de manera altamente selectiva los receptores de angiotensina II. La angiotensina II es el principal agente presor del sistema renina-angiotensina con efectos que incluyen vasoconstricción, estimulación de la síntesis y liberación de aldosterona, estimulación cardíaca y reabsorción renal del sodio. Bloqueando los efectos vasoconstrictores de la angiotensina II, por medio del bloqueo selectivo de la unión con el receptor AT1 en el músculo liso vascular. Con acciones independientes de las vías para la síntesis de la angiotensina II. El olmesartán posee una afinidad 12.500 veces más por el receptor AT1 que por el receptor AT2. Debido a que el olmesartán no inhibe la ECA (quinasa II) no afecta la respuesta a la bradiquinina, acciones responsables de la etiopatogenia de tos secundaria al uso de fármacos inhibidores de la ECA.

INDICACIONES

- Hipertensión arterial en sus diversos estadios, tanto en monoterapias, como en combinación con agentes antihipertensivos de otro tipo, asociados o no con diuréticos.
- Tratamiento de ICC.
- Profalaxis de proteinuria y nefropatía diabética.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente se ha reportado diarrea, cefalea, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, fatiga, edema periférico, angioedema, vértigo, dolor abdominal, dispepsia, gastroenteritis, náuseas, taquicardia refleja, artralgia, mialgia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

La dosis inicial recomendada en monoterapia es 20 mg una vez por día. Si al cabo de dos (2) semanas de tratamiento fuere necesario un efecto antihipertensivo adicional, se recomienda elevar la dosis a 40 mg por día. En pacientes con sobrecarga volémica, se recomienda administrar el olmesartán en concentraciones de 20 a 40 mg combinado con 12.5 a 25 mg de hidroclorotiazida.

PRESENTACIONES

Olmesar® 20 mg: Caja con 30 comprimidos.
Olmesar® 40 mg: Caja con 30 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Venta bajo prescripción médica.



Elaborado por:
Laboratorios Sued, S.R.L.
Carretera La Isabela, Pantoja,
Santo Domingo, República Dominicana.
Apartado Postal 847
www.labsued.com