



Paramox

(aminosidina)

Capletas / Gotas / Jarabe

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR.

Antibiótico de Amplio Espectro/Protozoicida/Tenicida/ Criptosporicida.

COMPOSICIÓN	Capletas	Jarabe	Max	Gotas
Sulfato de Aminosidina	250 mg ó 500 mg	125 mg	125 mg	70 mg
Excipientes: c.s.p.	1 capleta	5 mL	5 mL	1 mL

DESCRIPCIÓN

PARAMOX® es aminosidina, un antibiótico aminoglucósidos, microbicida, carente de efectos sistémicos.

INDICACIONES

- Infecciones del tracto digestivo, diarreas o no, agudas o crónicas, causadas por gérmenes grampositivos o gramnegativos sensibles, entre los cuales cabe mencionar Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Aerobácter, Proteus, Enterococos...
- Protozoosis intestinal debida a agentes como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Balantidium coli, Blastocitos hominis.
- Para llevar a cabo la esterilización de la flora de los intestinos, previo a la cirugía de éstos.
- Para llevar a cabo la esterilización de la flora intestinal amonioproductora en casos de cirrosis hepática.
- Infestación intestinal por tenias.
- Criptosporidiosis intestinal.

CONTRAINDICACIONES

Alergia conocida a éste u otros antibióticos del grupo aminoglucósido. Obstrucción intestinal. Insuficiencia renal. Miastenia Gravis.

ADVERTENCIAS

Este medicamento ha sido concebido para usarse sólo por la vía oral. Cuando así se lo utiliza se encuentra virtualmente exento de efectos sistémicos, ocurriendo su eventual eliminación casi total por las heces fecales. Debe tenerse el cuidado, sin embargo, de no administrarlo a pacientes con lesiones del tracto digestivo que favorezcan su absorción masiva. En el raro caso de que se diera este evento, el prescriptor deberá referirse a la farmacodinámica, a la farmacodinamia y a la toxicidad de otros aminoglucósidos, grupo al que pertenece la aminosidina. Se recuerda, en caso de diarrea, siempre tener en cuenta medidas generales de soporte del paciente, como es la reposición hidroelectrolítica. Se desaconseja el uso de grandes dosis y/o períodos prolongados, a fin de evitar el desequilibrio de la flora bacteriana regular de intestinos delgados y colon y, con esto, la ocurrencia de sobreinfecciones.

EFFECTOS ADVERSOS

Cuando se administra en grandes dosis, puede ocurrir ocasionalmente: náuseas, vómitos, anorexia, cólicos abdominales, pirosis e infecciones intestinales causadas por gérmenes oportunistas.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia, pues el sulfato de aminosidina carece de absorción gastrointestinal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

POSOLOGÍA

Paramox® Capletas 250 ó 500 mg:

Infecciones bacterianas del tracto digestivo: Pacientes adultos, 250 a 500 mg cada 8 horas, o calcular la dosis ponderal a razón de 30 a 40 mg / kg de peso por 24 horas, dosificadas cada 8 horas, por el tiempo que considere el médico tratante.

Amebiasis Intestinal: 1 a 2 gramos cada 8 horas, durante 8 días.

Teniasis: 1 gramo cada 15 minutos hasta completar 4 dosis.

Himenolepiasis en adultos y niños mayores de 12 años: 35 a 45 mg / kg de peso como dosis única diaria, durante 7 días.

Tratamiento coadyuvante del coma hepático: 1 gramo cada 12 horas, durante 7 días.

Esterilización Intestinal: 2 gramos cada 24 horas, durante 3 días.

Cryptosporidiosis Intestinal: Adultos inmunodeficientes, 1.5 a 2.5 gramos por día, durante 10 a 14 días.

Paramox® Jarabe / Paramox® Max:

Infecciones del tracto digestivo:

Niños mayores de 2 años: 20 a 50 mg por kg de peso cada 24 horas, cada 8 horas, por el tiempo que establezca el médico tratante.

Amebiasis intestinal: 25 a 40 mg por kg de peso.

Teniasis: 11 mg por kg de peso cada 15 minutos hasta completar 4 dosis.

Himenolepiasis: 45 mg por kg de peso como dosis única por día, durante 7 días.

Esterilización intestinal: 50 mg por kg de peso cada 24 horas durante 3 días.

Paramox® Gotas:

Deberá administrarse cada 8 horas, hasta tanto se compruebe la erradicación del agente causal.

Correspondencia Ponderal-Cronológica:

Peso en Libras	Peso Kg	Edad en Meses	Dosis en mg	Dosis en Gotas
6 a 16 lbs	3 a 7 kg	0 a 6	45 a 105	13 a 30 gotas
16.5 a 20 lbs	8 a 9 Kg	6 a 11	120 a 135	34 a 39 gotas
20.5 a 27 lbs	9 a 12 Kg	12 a 24	135 a 180	39 a 51 gotas 135 a 180

PRESENTACIONES

Paramox® 250 mg Capletas: Caja con 12 capletas.

Paramox® 500 mg Capletas: Caja con 12 capletas y caja dispensadora de 60 capletas.

Paramox® Jarabe: Frasco con 60 mL.

Paramox® Max: Frasco con 125 mL.

Paramox® Gotas: Frasco con 30 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

MANTENGA ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Conserve en lugar fresco (entre los 15 y 30°C), seco y protegido de la luz.

Su venta requiere prescripción médica.

INFORMACIONES ADICIONALES

Consulte la Dirección Médica de LABORATORIOS SUED, S.R.L.

Tel.: 809- 682-4344 / fax: 809- 686-1010

Elaborado por:



Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana.
www.labsued.com

® Marca registrada.

Rev. 28/10/2015.