

prefex

Betametasona + Dexclorfeniramina
Jarabe

Antihistamínico Dual.

Composición:

Prefex® Jarabe

Cada 5 mL (una cucharada) contiene:

Betametasona..... 0.25 mg

Dexclorfeniramina..... 2 mg

Excipientes, c.s.p. 5 mL

Descripción: Prefex® Combina los efectos anti-inflamatorios y antialérgicos de la betametasona con la actividad antihistamínica de la dexclorfeniramina. Al combinar betametasona con dexclorfeniramina, generalmente se obtienen resultados positivos sin la necesidad de administrar dosis mayores de esteroides.

Indicaciones: Prefex® se recomienda para el tratamiento sintomático de las manifestaciones alérgicas e inflamatorias, agudas o crónicas de las vías respiratorias, dermatológicas y oculares.

Usos: las afecciones representativas incluyen fiebre del heno severa (polenosis), asma bronquial severa, rinitis alérgica perenne, dermatitis atópica (eczema), dermatitis por contacto, reacciones farmacológicas y enfermedad del suero. Los trastornos inflamatorios oculares incluyen conjuntivitis alérgica, queratitis, iritis no granulomatosa, iridociclitis, coroiditis, coriorretinitis y uveitis.

Prefex® está indicado para el control de estados alérgicos con componente exudativo de las enfermedades oculares, ayudando así a conservar la integridad funcional del ojo mientras permite la administración del tratamiento apropiado para la infección específica.

Contraindicaciones: Está contraindicado en pacientes con infecciones micóticas sistémicas, neonatos y bebés prematuros, pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de la MAO y en los que han demostrado hipersensibilidad o idiosincrasia a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Uso durante el embarazo y la lactancia: Está contraindicado durante el primer trimestre del embarazo.

Reacciones adversas: Suele ocurrir somnolencia y síntomas secundarios al uso de esteroides.

Dosis: Las dosis deben individualizarse y ajustarse de acuerdo con la enfermedad específica que se esté tratando, el grado de severidad de los síntomas y la respuesta del paciente. A medida que se observa mejoría, la posología debe reducirse gradualmente hasta llegar a un nivel mínimo de mantenimiento y suspender el tratamiento cuando sea posible.

Dosis recomendadas:

Niños de 2 a 6 años: La dosis inicial debe ser de ¼ (1.25mL) a ½ (2.5mL) cucharada 3 veces al día, ajustándola de acuerdo con la respuesta del paciente. En niños más pequeños, la posología debe ajustarse de acuerdo con la severidad de la afección y la respuesta del paciente, más bien que de acuerdo con la edad o peso corporal.

Niños de 6 a 12 años: La posología recomendada es ½ cucharada (2.5mL) de jarabe) 3 veces al día. Si se necesita una dosis diaria adicional, preferiblemente debe tomarse a la hora de acostarse. Las dosis no deben exceder las 4 cucharadas de jarabe al día.

Adultos y niños mayores de 12 años: Una cucharada (5 mL) 3 veces por día.

Presentación:

Prefex® Jarabe: Frasco con 120 mL.

Leyendas de Protección:

Producto medicinal

Su venta requiere prescripción médica.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Conserve en un lugar fresco (entre 15° y 25°C), seco y protegido de la luz.

Informaciones adicionales:

Consulte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S. R. L. a través de los siguientes medios:

Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010.



Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana.
www.labsued.com