

Promater®

Vitaminas y Minerales Prenatales | Cápsulas

con esencia de chocolate

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR.

Composición:

Cada cápsula softgel contiene:

Vitamina A	Ph. Eur	4,000 UI
Vitamina D	Ph. Eur	400 UI
Vitamina B1	Ph. Eur	2.00 mg
Vitamina B2	Ph. Eur	2.00 mg
Nicotinamida	Ph. Eur	10.00 mg
Vitamina B6	Ph. Eur	2.00 mg
Pantotenato de calcio	Ph. Eur	2.00 mg
Acido fólico	Ph. Eur	0.25 mg
Vitamina C	Ph. Eur	37.50 mg
Vitamina B12		2.00 mcg
Carbonato de calcio	JP	100.00 mg
Vitamina E	Ph. Eur	1.00 UI
Hierro (como fumarato ferroso)	BP	20.00 mg
Cobre (como sulfato de de cobre)	Ph. Eur	0.50 mg
Yodo (como yoduro potásico)	Ph. Eur	0.05 mg
Magnesio (como sulfato de magnesio)	USP	1.00 mg
Manganeso (como sulfato de manganeso)	USP	0.10 mg
Potasio (como sulfato de potasio)	Ph. Eur	1.00 mg
Zinc (como sulfato de zinc)	USP	0.15 mg
<i>Excipientes c.b.p. Una cápsula softgel.</i>		

Indicaciones terapéuticas: Promater es un suplemento nutricional con sabor a chocolate, útil para el manejo y prevención de estados carenciales nutricionales durante el embarazo y el período de la lactancia. Aportando 19 nutrientes esenciales, incluyendo zinc y ácido fólico.

Contraindicaciones: Promater está contraindicado en los pacientes con alergia conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula. No utilizar en pacientes con hemocromatosis, hemosiderosis, anemia hemolítica, hipervitaminosis A y/o hipervitaminosis D, hipercalcemia e hipercalciuria, niños menores de 12 años.

Precauciones generales: Después de la administración oral o parenteral se puede presentar sensibilización alérgica a cualquiera de los componentes de las cápsulas. Promater no está indicado para el tratamiento de la anemia perniciosa y no debe emplearse en pacientes con hipervitaminosis A y/o D, insuficiencia renal, hemosiderosis, hipercalcemia e hipercalciuria.

Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: El hierro, las vitaminas y las sales minerales que contiene Promater proveen el suplemento requerido durante el embarazo y la lactancia. Promater es bien tolerado y las cápsulas se pueden tomar a cualquier hora, con o sin alimentos, sin que la absorción de sus componentes se vea afectada.

Reacciones secundarias y adversas: Promater es bien tolerado. En casos aislados pueden presentarse ligeros trastornos gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, constipación y rash.

Interacciones medicamentosas y de otro género: No se recomienda el empleo concomitante de productos que contienen hierro y tetraciclinas, ya que interfieren mutuamente con la absorción. Si se requiere, se deben administrar los 2 medicamentos de manera separada (se recomienda un intervalo de por lo menos 2 horas). Promater no se debe administrar a pacientes con enfermedad de Parkinson bajo tratamiento con levodopa pura.

Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: El ácido ascórbico es un agente reductor que interfiere con las pruebas de laboratorio basadas en reacciones de óxido reducción. Dosis elevadas de vitamina C pueden generar incrementos falsos en los niveles séricos de bilirrubina. Hierro es posible que interfiera con las pruebas de laboratorio para buscar sangre oculta en heces.

Precauciones en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad: No se realizaron estudios de seguridad preclínica, ya que los preparados multivitamínicos son generalmente considerados como seguros por la FDA.

Dosis y vía de administración: Una cápsula al día, por vía oral. Las cápsulas se pueden tomar con los alimentos.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental: En caso de ingestión accidental o inadvertida de una dosis mayor a la recomendada, se debe consultar inmediatamente al médico.

Presentación: Caja con 30 cápsulas softgels con sabor a chocolate.

Recomendaciones sobre almacenamiento: Consérvese a temperatura a no más de 30°C y protéjase de la luz.

Producto medicinal.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Conserve en lugar fresco (entre los 20 a 25°C), seco y protegido de la luz. Su venta requiere prescripción médica.

INFORMACIONES ADICIONALES:

Consulte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S.R.L.
Tel.: 809- 682-4344 / fax: 809- 686-1010

Manufacturado por:

Arnett Pharmaceuticals

2525 Davie Road, Suite # 330
Davie Florida 33317, USA

Para:



SUED & FARGESA
S.R.L.

Santo Domingo, República Dominicana.

Reg. Ind. No.

Reg. San. No.

® Marca registrada.