

Sinedol[®]FORTE

Acetaminofén Premium 750 mg | Capletas

Composición	Capletas
Acetaminofén	750 mg

DESCRIPCIÓN

Sinedol[®]FORTE: Analgésico - Antipirético que pertenece al grupo de la acetanilida.

Sinedol[®]FORTE: A diferencia de los salicilatos y otros similares no producen irritación gástrica.

Su acción es inmediata y eficaz en lactantes, niños, adolescentes y adultos.

El efecto analgésico se debe a su acción depresora selectiva sobre el aparato de la percepción del dolor del SNC.

Sinedol[®]FORTE: Reduce la fiebre por su efecto directo sobre el centro termorregulador del sistema nervioso central.

Sinedol[®]FORTE: A diferencia de las pirazonas (dipirona y aminofenazona) está exento de las posibilidades de Inducir agranulocitosis, que puede ser fatal.

INDICACIONES

Sinedol[®]FORTE: Está indicado en fiebres por causas diversas, dolor músculo esquelético, dolor leve y moderado de cabeza, migraja, neuralgia, en los síntomas de resfriado común, como analgésico en el dolor de oído y después de extracción dental, malestar menstrual y estado postquirúrgico simple.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al acetaminofén, Hipertiroidismo y arritmia ventricular.

En pacientes con insuficiencia renal y/o hepáticas evitar tratamientos prolongados.

No se debe combinar con ácido acetilsalicílico u otros analgésicos.

REACCIONES ADVERSAS

Si se toma en las dosis recomendadas, el acetaminofén usualmente carece de efectos secundarios.

La ingestión de alta dosis puede producir ocasionalmente mareos, nerviosismo e Insomnio. También puede producir reacciones cutáneas. La evidencia clínica y de laboratorio de hepatotoxicidad puede demorarse en aparecer hasta una semana.

VIA DE ADMINISTRACIÓN Oral.

DOSIS

Adultos y niños mayores de 12 años, 1 capleta cada 6 a 8 horas.

PRECAUCIONES

Se debe administrar con precaución en pacientes adultos mayores con datos de disfunción hepática, renal y en aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad ácido-péptica. El acetaminofén puede producir daño hepático cuando es administrado por periodos prolongados.

INTERACCIONES

A dosis elevadas, acetaminofén puede potenciar el efecto de los anticoagulantes orales. La propantelina disminuye la velocidad de absorción del acetaminofén y la metoclopramida la acelera. Puede aumentar la toxicidad del cloranfenicol. Se debe tener especial cuidado en pacientes que ingieren medicamentos hepatotóxicos, particularmente con fármacos antiinflamatorios, antiepilépticos y el probenecid. La administración concomitante de barbitúricos y antidepresivos tricíclicos pueden disminuir el metabolismo de dosis altas de acetaminofén, con prolongación de la vida media plasmática.

El alcohol puede aumentar la hepatotoxicidad de la sobredosificación con acetaminofén La ingesta crónica de anticonceptivos orales inducen enzimas hepáticas y podría incrementar las concentraciones terapéuticas de acetaminofén al aumentar el metabolismo del primer paso y su eliminación.

SOBREDOSIS

La reacción más severa por sobredosificación puede ser necrosis hepática después de ingerir dosis únicas de 10 a 15 g con intentos suicidas. Las dosis de 25 g o más son potencialmente mortales. La intoxicación se puede manifestar por palidez, náuseas, anorexia, vómitos y dolor abdominal, en casos extremos puede haber alteraciones de la función hepática así como insuficiencia renal, depresión respiratoria, colapso cardiovascular, acidosis metabólica y arritmias cardíacas. En caso de sobredosis o ingesta accidental, acuda al centro de salud más cercano.

PRESENTACIÓN

Sinedol[®]FORTE: Caja conteniendo 20 y 100 capletas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Venta bajo prescripción médica.

Mantener éste y todos los medicamentos, fuera del alcance de los niños.

Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES

Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.

Tel.: (809) 686-1150 / Fax: (809) 686-1010

www.labsued.com



Elaborado por:
Laboratorios Sued, S.R.L.
Carretera La Isabela, Pantoja,
Santo Domingo, República Dominicana.
Apartado Postal 847

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.:

©Marca registrada