

SUBROX

amoxi dúo

Composición	Capleta	Suspensión
Amoxicilina Trihidrato, Equivalente a: Amoxicilina Base	875 mg	750 mg
Ambroxol, HCl	30 mg	15 mg
Excipientes, c. s. p.	1 capleta	5 mL

Instrucciones para preparar la suspensión:

1. Sacuda el frasco para despegar el polvo adherido a sus paredes.
2. Añada un poquito de agua potable a temperatura ambiente.
3. Agite hasta formar una suspensión homogénea.
4. Agregue de nuevo agua, hasta donde indica la flecha de "Nivel de agua".

DESCRIPCIÓN

Subrox® amoxi dúo es la combinación de un antibiótico con amplio espectro antibacteriano, tipo bactericida (Amoxicilina) y un mucolítico con propiedades antitusivas y expectorantes (el Ambroxol, HCl). La concentración de Amoxicilina presente en **Subrox® amoxi dúo** se encuentra duplicada con el propósito de ser administrada en sólo dos tomas al día.

Eficacia clínica de la Amoxicilina: Numerosos estudios clínicos han sido realizados con diferentes dosis de Amoxicilina y distintos esquemas de tratamiento. Recientes evidencias científicas han confirmado la utilidad de esta nueva presentación de sólo dos tomas al día. Muchos autores sostienen que dosis superiores a las acostumbradas logran saturar la capacidad de absorción gástrica luego de la ingestión oral, lo que provoca saturación del medio y enlentecimiento de la absorción, logrando niveles terapéuticos más estables y concentraciones inhibitorias adecuadas. Los autores Chomarat, M. et al, demostraron que la Amoxicilina posee muy buena penetración tisular, principalmente en las amígdalas, llegando a obtener concentraciones tisulares y séricas superiores a la concentración mínima inhibitoria (CMI) necesaria para suprimir un agente sensible a Amoxicilina, incluyendo *Streptococcus pyogenes*. Otro estudio clínico llevado a cabo con Amoxicilina, administrada 2 veces al día durante 6 días a pacientes adultos con faringoamigdalitis estreptocócica aguda, mostró alta eficacia en estas patologías.

INDICACIONES

Infecciones del tracto broncorespiratorio alto y bajo asociadas a estancamiento de secreciones mucosas: otitis, sinusitis, faringoamigdalitis, neumonías, bronconeumonías y bronquitis crónica exacerbada causadas por bacterias sensibles a la Amoxicilina.

REACCIONES ADVERSAS

En general, la asociación es bien tolerada, ocasionalmente pueden presentarse náuseas, vómito y rash cutáneo. Excepcionalmente la amoxicilina por vía oral puede presentar reacción alérgica, en algunos casos grave.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Con el ambroxol no se conocen interacciones con otros medicamentos.

La amoxicilina prolonga su vida media plasmática por efecto del probenecid y el ácido clavulánico potencia el efecto de ésta.

PRECAUCIONES

Adminístrese con cuidado en pacientes con úlcera gástrica. Se deberá investigar alergias de cualquier tipo antes de administrar el medicamento. Si durante el tratamiento el paciente llega a presentar erupción cutánea tipo urticaria u otro dato de tipo alérgico se deberá suspender la administración. Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática y renal.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

Una sobredosis considerable de amoxicilina producirá muy altas concentraciones en orina; es poco probable que surjan problemas si se mantiene una eficaz ingesta de líquidos y una producción de orina adecuada.

El antibiótico puede eliminarse mediante hemodiálisis. En caso de sobredosis o ingesta accidental, acuda al hospital más cercano.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes alérgicos a cefalosporinas, gastritis y úlceras gástricas.

La amoxicilina pertenece al grupo de las penicilinas, no se debe administrar en pacientes alérgicos a ella.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIFICACIÓN

• Subrox® amoxi dúo capletas:

o Adultos y niños mayores de 12 años, una (1) capleta cada 12 horas.

• Subrox® amoxi dúo suspensión:

o Niños de 2 a 5 años, 2.5 mL (1/2 cucharada) cada 12 horas.

o Niños de 6 a 11 años, 5 mL (1 cucharada) cada 12 horas.

PRESENTACIONES

Subrox® amoxi dúo capletas: Caja con 10 capletas. (2 blister x 5)

Subrox® amoxi dúo suspensión: Caja conteniendo un frasco con 33.3g de polvo para preparar 60 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Uso bajo prescripción médica.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES

Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.

Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010

E-mail: dir.medica@suedfarma.com

www.labsued.com



Elaborado por:
Laboratorios Sued, S.R.L.
Carretera La Isabela, Pantoja,
Santo Domingo, República Dominicana
Apartado Postal 847
www.labsued.com

Reg. Ind. No.18055.

Regs. Sans. Nos.:

Subrox® amoxi dúo capletas: 2009-0116

Subrox® amoxi dúo suspensión: 2009-0115

®Marca registrada