



# sumox dúo

Capletas / Suspensiones.

*Antibiótico bactericida de espectro ampliado.*

COMPOSICIÓN	Capletas	Suspensión	Gotas
Amoxicilina trihidratada	875 mg	750 mg	200 mg
Excipientes, c.s.p.	1 capleta	5 mL	1 mL

## DESCRIPCIÓN

Sumox dúo® es un antibiótico penicilínico con amplio espectro antibacteriano, tipo bactericida, concebido para el manejo de infecciones causadas por agentes infecciosos sensibles a Amoxicilina.

Sumox dúo® se presenta en concentraciones antibióticas duplicadas, con el propósito de administrar este fármaco en sólo dos tomas por día.

**Eficacia clínica:** Numerosos estudios clínicos han sido realizados con diferentes dosis de Amoxicilina y distintos esquemas de tratamiento. Recientes evidencias científicas han confirmado la utilidad de esta nueva presentación de sólo dos tomas al día. Muchos autores sostienen que dosis superiores a las acostumbradas logran saturar la capacidad de absorción gástrica luego de la ingestión oral; lo que provoca saturación del medio gástrico y enlentecimiento de la absorción, logrando niveles terapéuticos más estables y concentraciones inhibitorias adecuadas. Los autores Chomarat, M. et al. demostraron que la Amoxicilina posee muy buena penetración tisular, principalmente en amígdalas y tejidos peridentarios, llegando a obtener concentraciones tisulares y séricas superiores a la concentración mínima inhibitoria (CMI) necesarias para suprimir un agente sensible a Amoxicilina, incluyendo el *Streptococcus pyogenes*.

**Mecanismo de Acción:** La Amoxicilina actúa por inhibición en la biosíntesis de mucopéptidos de la pared celular bacteriana en fase de multiplicación activa.

## INDICACIONES

Profilaxis y tratamientos de infecciones buco-maxilo-faciales e infecciones del tracto respiratorio alto y bajo causadas por agentes bacterianos sensibles a la amoxicilina.

## CONTRAINDICACIONES

Pacientes con antecedentes alérgicos a penicilinas y/o cefalosporinas.

## USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Su uso está aprobado durante el embarazo.

## REACCIONES ADVERSAS

Sumox duo plus® es bien tolerado, aunque se pueden presentar algunos malestares gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito, reacciones dermatológicas y cefalea.

Colitis pseudomembranosa.

En el caso de la amoxicilina se sabe que interfiere al igual que otros antibióticos con los anticonceptivos en la circulación enterohepática de los estrógenos.

El uso de alopurinol o hiperuricemiantes puede predisponer la aparición de erupción.

El probenecid prolonga la vida media plasmática de la amoxicilina.

El ácido clavulánico potencia el efecto de la amoxicilina en infecciones por gérmenes productores de lactamasa.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antecedentes alérgicos a antibióticos betalactámicos y/o cefalosporínicos.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El uso de este producto posee muy baja tasa de interacciones medicamentosas con otros fármacos.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

## SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL

En caso de sobredosis e ingesta accidental, consulte de inmediato un servicio médico.

## POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Sumox dúo® capletas:

Adultos: Serán administradas cada 12 horas en las concentraciones que exija el caso y el criterio del médico.

Sumox dúo® suspensión:

Las dosis serán administradas cada 12 horas a razón de 5 mL, o según considere el médico.

Sumox dúo® gotas:

1 gotero = 20 gotas = 200mg.

1/2 gotero = 10 gotas = 100mg.

1 gota = 10 mg.

**Lactantes y niños hasta 2 años:** 40 a 60 mg/kg/día, divididos en dos dosis, administradas cada 12 horas.

**Recién nacidos y lactantes menores de 3 meses:** Debido a que la eliminación de la Amoxicilina puede encontrarse afectada en pacientes de estas edades, la dosis máxima recomendada es 30 mg/kg/día en dosis divididas cada 12 horas. Dosis usual máxima: 100 mg/kg/día. Las infecciones ocasionadas por gérmenes menos susceptibles deben ser tratadas con las dosis recomendadas para las infecciones severas.

Sumox dúo® puede administrarse sin inconvenientes después de haber ingerido alimentos.

## PRESENTACIONES

Sumox dúo® capletas: Caja con 10 capletas.

Sumox dúo® suspensión: Frasco con polvo para preparar suspensión extemporánea de 60 mL.

Sumox dúo® gotas: Frasco con polvo para preparar suspensión extemporánea de 15 mL.

## LEYENDAS DE PROTECCIÓN

*Producto Medicinal.*

Su venta requiere prescripción médica.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Conserve en lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz.

## Informaciones adicionales:

Consulte la Dirección Médica de Laboratorios Sued, S.R.L.

(809) 682-4344 / (809) 686-1010

Elaborado por:



**Laboratorios Sued, S.R.L.**  
Santo Domingo,  
República Dominicana.  
www.labsued.com

Rev.: 02/11/2014.

®Marca registrada..

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.: