



# SUPLEVIT<sup>®</sup>

## prenatal

Multivitaminas | Cápsulas

### COMPOSICIÓN

Cada cápsula softgel contiene:

Vitamina A (como vitamina A palmitato)	4000 UI
Vitamina C (como ácido ascórbico)	37.5 mg
Vitamina D (como colecalciferol)	400 UI
Vitamina E (como dl-alfatocoferil acetato)	1 UI
Tiamina (vitamina B1) (como tiamina mononitrato)	2 mg
Riboflavina (vitamina B2)	2 mg
Niacina (como niacinamida)	10 mg
Vitamina B6 (como piridoxina clorhidrato)	2 mg
Folato (como ácido fólico)	250 mcg
Vitamina B12 (como cianocobalamina)	2 mcg
Ácido pantoténico (como d-calcio pantotenato)	2 mg
Calcio (como carbonato de calcio)	100 mg
Hierro (como fumarato ferroso)	20 mg
Yodo (como yoduro de potasio)	50 mcg
Magnesio (como sulfato de magnesio)	1 mg
Zinc (como sulfato de zinc)	0.15 mg
Cobre (como sulfato cúprico)	0.5 mg
Manganeso (como sulfato de manganeso)	1 mg
Potasio (como sulfato de potasio)	1 mg
Excipientes, c.s.p.	1 cápsula

### INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Suplemento nutricional con sabor a chocolate, útil para el manejo y prevención de estados carenciales nutricionales durante el embarazo y el período de la lactancia. Aportando 19 nutrientes esenciales, incluyendo zinc y ácido fólico.

### CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en los pacientes con alergia conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula. No utilizar en pacientes con hemocromatosis, hemosiderosis, anemia hemolítica, hipervitaminosis A y/o hipervitaminosis D, hipercalcemia e hipercalciuria, niños menores de 12 años.

### PRECAUCIONES GENERALES

Después de la administración oral o parenteral se puede presentar sensibilización alérgica a cualquiera de los componentes de las cápsulas. Suplevit Prenatal no está indicado para el tratamiento de la anemia perniciosa y no debe emplearse en pacientes con hipervitaminosis A y/o D, insuficiencia renal, hemosiderosis, hipercalcemia e hipercalciuria.

### RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

El hierro, las vitaminas y las sales minerales que contiene Suplevit Prenatal proveen el suplemento requerido durante el embarazo y la lactancia. Suplevit Prenatal es bien tolerado y las cápsulas se pueden tomar a cualquier hora, con o sin alimentos, sin que la absorción de sus componentes se vea afectada.

### REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Suplevit Prenatal es bien tolerado. En casos aislados pueden presentarse ligeros trastornos gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, constipación y rash.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

No se recomienda el empleo concomitante de productos que contienen hierro y tetraciclinas, ya que interfieren mutuamente con la absorción. Si se requiere, se deben administrar los 2 medicamentos de manera separada (se recomienda un intervalo de por lo menos 2 horas). Suplevit Prenatal no se debe administrar a pacientes con enfermedad de Parkinson bajo tratamiento con levodopa pura.

### ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO

El ácido ascórbico es un agente reductor que interfiere con las pruebas de laboratorio basadas en reacciones de óxido reducción. Dosis elevadas de vitamina C pueden generar incrementos falsos en los niveles séricos de bilirrubina. Hierro es posible que interfiera con las pruebas de laboratorio para buscar sangre oculta en heces.

### PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD

No se realizaron estudios de seguridad preclínica, ya que los preparados multivitaminicos son generalmente considerados como seguros por la FDA.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.

### DOSIS

Una cápsula al día. Las cápsulas se pueden tomar con los alimentos.

### MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

En caso de ingestión accidental o inadvertida de una dosis mayor a la recomendada, se debe consultar inmediatamente al médico.

### PRESENTACIÓN

Caja con 30 cápsulas softgels con sabor a chocolate.

### RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO

Consérvese a temperatura a no más de 30°C y protéjase de la luz.

### LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

*Producto medicinal.*

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Su venta requiere prescripción médica.

Elaborado por:

**Arnett Pharmaceuticals**

2525 Davie Road, Suite # 330

Davie Florida 33317, USA.

Para:



**Laboratorios Sued, S.R.L.**  
Santo Domingo,  
República Dominicana.  
[www.labsued.com](http://www.labsued.com)

Reg. Ind. No.

Reg. San. No.

® Marca registrada.