



VALSARTEC® 160/320 mg

valsartán

Capletas

COMPOSICIÓN

VALSARTEC®

Cada capleta ranurada contiene:

Valsartán..... 160 ó 320 mg

Excipientes: c.b.p...1 capleta

DESCRIPCIÓN:

VALSARTEC® es valsartán. Un antihipertensivo perteneciente al grupo de los llamados Antagonista de los Receptores de Angiotensina II (ARA II). Para ser administrado solo o en combinación con otros agentes antihipertensivos. El cual actúa como un antagonista de los receptores de la angiotensina II de tipo I (AT1).

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de las fórmulas.

PRECAUCIONES

Pacientes hipovolémicos o hiponatrémicos con pronunciada disminución de sodio y/o de volumen. Se debe tener precaución en caso de falla renal o estenosis aórtica/mitral significativa. Usar con cuidado en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal. Se debe evitar el uso en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, estenosis unilateral de arteria renal, enfermedad coronaria o cardiomiopatía hipertrófica. No se ha establecido seguridad y eficacia en menores de 18 años.

REACCIONES ADVERSAS

Durante la terapia con valsartán solo o en combinación con hidroclorotiazida, se han reportado las siguientes reacciones adversas: Fatiga, mareo, hipotensión, hipotensión postural, hiperkalemia, diarrea, dolor abdominal, anemia, alergia, alopecia, angioedema, anorexia, ansiedad, astenia, calambres, disfunción renal (especialmente en pacientes dependientes del sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona), disnea, dispepsia, flatulencia, hiperkalemia, impotencia, insomnio, mialgia, ortostatismo, parestesias, prurito, síncope, vértigo, vómito, xerostomía.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

Hipertensión e insuficiencia cardíaca: la dosis será administrada según recomendaciones del médico tratante.

SOBREDOSIS

Los datos disponibles acerca de la sobredosis en humanos son limitados. Las manifestaciones más probables de sobredosis serían hipotensión y taquicardia; podría presentarse bradicardia por estimulación parasimpática (vagal). En caso de que ocurriera hipotensión sintomática, se debe instaurar el tratamiento de soporte. El Valsartán no puede ser removido del plasma por hemodiálisis.

PRESENTACIONES

VALSARTEC® 160 mg: Caja con 30 capletas ranuradas.

VALSARTEC® 320 mg: Caja con 30 capletas ranuradas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Conserve en lugar fresco (menor a 30°C), seco y protegido de la luz.

Su venta requiere receta médica.

Elaborado por:



Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana.
www.labsued.com

*Marca registrada.