

CETIRINA-D

(Cetirizina + Pseudoefedrina)

Cápsulas / Jarabe

Antihistamínico / Descongestionante.

COMPOSICIÓN	Cápsulas de liberación prolongada	Jarabe
Cetirizina	5 mg	5 mg
Pseudoefedrina	120 mg	60 mg
Excipientes, c.s.p.	1 cápsula	5 mL

INDICACIONES

Estados alérgicos asociados a congestión de las vías respiratorias, así como condiciones alérgicas oftalmológicas asociadas a congestión conjuntival.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a principios activos de la fórmula, hipertensión, taquiarritmias, tirotoxicosis, uso concomitante con drogas anfetamínicas, descongestionantes y antihistamínicos, insuficiencia renal, embarazo y lactancia descongestionantes, hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula, insuficiencia renal, embarazo y lactancia.

PRECAUCIONES GENERALES

Manejo de vehículos y maquinaria: no se observaron modificaciones sobre la capacidad de atención o el tiempo de reacción en estudios realizados con dosis diarias de 20 a 25 mg en voluntarios sanos, sin embargo, es conveniente advertir al paciente de no sobrepasar la dosis recomendada si conducen u operan maquinaria.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Contraindicado su uso durante estas etapas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS

Los efectos secundarios suelen incluir somnolencia, cefalea, mareo, agitación, sequedad bucal y molestias gastrointestinales.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO

Evitar el consumo de alcohol y el uso de tranquilizantes durante el tratamiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

CETIRINA D® Jarabe

Edades	Dosis
Niños de 2 a 6 años	2.5 mL cada 12 horas
Niños de 6 a 12 años	5 mL cada 12 horas
Adultos y niños mayores de 12 años	10 mL cada 24 horas

CETIRINA D® Cápsulas

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 cápsula cada 12 horas.

Hasta el momento, no hay suficientes datos clínicos que sugieran disminuir la dosis en ancianos, siempre que la función renal sea normal.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL

La somnolencia puede ser un síntoma de sobredosis. En los niños se puede presentar agitación. En caso de sobredosis masivas se realizará cuanto antes un lavado gástrico. Se aconseja terapia sintomática de soporte con control frecuente de las funciones vitales. Hasta la fecha no se conoce antídoto específico.

PRESENTACIONES

CETIRINA D® Cápsulas: Caja con 10 cápsulas de liberación prolongada.

CETIRINA D® Jarabe: Frasco con 60 mL.

LEYENDA DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Venta bajo prescripción médica.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Conserve en un lugar fresco (entre 15° y 25° C), seco y protegido de la luz.

Elaborado por:



Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana.
www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.:

® Marca registrada.

Rev. 03/03/2016.