

Narcaricin®

Benzbromarona 100 mg | **Comprimidos**

Hipouricemiente / Antigotoso.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Benzbromarona..... 100 mg

Excipientes, c. s. p. 1 comprimido.

DESCRIPCIÓN

Narcaricin® reduce los niveles de ácido úrico en caso de hiperuricemia responsable de gota o de alteraciones en el metabolismo de las purinas.

INDICACIONES

Hiperuricemias y manejo de gota aguda, así como también para la prevención de artritis secundaria a hiperuricemias y para tratar hiperuricemias causadas por fármacos.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes alérgicos e hipersensibilidad a la benzbromarona y/o al bromuro, hemopatías e insuficiencia renal (filtrado glomerular inferior a 30 mL/min. y creatinina sérica superior a 2,5 mg/100 mL).

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Contraindicado su uso durante estas etapas.

INTERACCIÓN CON OTRAS DROGAS

Narcaricin® reduce los efectos del Alopurinol. El Narcaricin® reduce su acción terapéutica cuando se administra junto al ácido etacrínico, salicilatos y sulfipirazona.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

Un (1) comprimido en las mañanas, acompañando al desayuno, o según considere el médico tratante.

Nota: tomar gran cantidad de líquidos durante el tratamiento con Narcaricin.

PRESENTACIÓN

Caja con 30 comprimidos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.

MANTENGA ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Conserve en un lugar fresco (entre los 15° y 30°C), seco y protegido de la luz.

Elaborado por:



Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana
www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.: 2003-2721

®Marca registrada.

Rev. 25/02/2016.