

Terbix

terbinafina

crema
solución
capletas

Antimicótico Sintético.

COMPOSICIÓN

TERBIX® Capletas

Cada capleta contiene clorhidrato de terbinafina 250mg.

Excipiente: c.s.p.

TERBIX® Crema

Clorhidrato de terbinafina al 1 %.

Excipiente: c.s.p.

TERBIX® Solución

Clorhidrato de terbinafina al 1 %.

Excipiente, c.s.p.

DESCRIPCIÓN

TERBIX® es un derivado sintético alilamínico con actividad antimicótica tópica y sistémica de lesiones micóticas causadas por hongos dermatofitos, *Aspergillus*, *Candida parapsilosis*, *Malassezia furfur*, *Cryptococcus neoformans*, hongos dimorfos, algunos agentes de la feohifomicosis, cromoblastomicosis, hialohifomicosis y micetoma.

INDICACIONES

TERBIX® Capletas

Tratamiento de afecciones micóticas de la piel, el pelo y las uñas causadas por *Trichophyton rubrum*, *Micosporum canis* y *Epidermophyton floccosum*. También para tratar onicomicosis causadas por dermatofitos y demás agentes micóticos sensibles al principio activo de TERBIX® (la terbinafina).

TERBIX® Crema

Infecciones micóticas de la piel producidas por dermatofitos tales como *Trichophyton* (por ejemplo, *T. rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*), *Microsporum canis* y *Epidermophyton floccosum*, por ejemplo, tinea pedis (pie de atleta: hongos en los pies), tinea pedis (tipo plantar), tinea cruris (tiña o tinea inguinal: prurito –comezón o picazón– inguinal) y tinea corporis (tiña o tinea corporal).

Las infecciones de la piel por levaduras, principalmente aquellas producidas por el género *Candida* (por ejemplo, *Candida albicans*: candidiasis de la piel –intertrigo–). *Pitiriasis versicolor* (tiña o tinea versicolor) debido a *Pityrosporum orbiculare* (también conocido como *Malassezia furfur*).

TERBIX® Solución

Tratamiento de infecciones micóticas de la piel y uñas causadas por dermatofitos tales como *Trychophyton*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*, *Candida* y *pitiriasis versicolor* debida a *Pityrosporum orbiculare*. Tratamiento de tinea corporis, tinea cruris y tinea pedis interdigital y plantar; tinea capitis y onicomicosis.

ADVERTENCIA

Contrario a las presentaciones en crema y solución, TERBIX® Capletas no es útil para tratar *pitiriasis versicolor*.

PRECAUCIÓN

No use TERBIX® Capletas conjuntamente con otro agente antimicótico.

CONTRAINDICACIONES

TERBIX® Capleta: Está contraindicado en personas hipersensibles a la terbinafina, uso concomitante de otras drogas antimicóticas, alcohol, durante el embarazo y la lactancia.

TERBIX® Crema: Hipersensibilidad a componentes de la fórmula.

TERBIX® Solución: Hipersensibilidad a componentes de la fórmula.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

No se recomienda el uso de TERBIX® en ninguna de sus formas farmacéuticas durante estas etapas.

USO TÓPICO EN NIÑOS

No se recomienda la administración tópica ni oral a menores de 5 años.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

TERBIX® Capletas: Oral.

TERBIX® Crema: Exclusivo uso tópico.

TERBIX® Solución: Exclusivo uso tópico.

DOSIS Y MODOS DE USO

TERBIX® Capletas

Se recomienda usar una capleta (250 mg/día); o según prescripción médica.

La experiencia clínica con este antimicótico para administrar por vía oral, reporta que se ha empleado para el tratamiento de infecciones en piel, cuero cabelludo y uñas causadas por dermatofitos y levaduras de varias especies.

Según el tipo de micosis, la literatura recomienda la siguiente duración del tratamiento:

Tinea pedis, dos a seis semanas. Tinea corporis y crural, dos a cuatro semanas. Candidiasis cutánea, dos a cuatro semanas.

Infecciones del cuero cabelludo: Tinea capitis, cuatro semanas.

Onicomicosis: de seis a doce semanas. Se ha observado que las uñas de la mano responden más rápido. La uña del dedo Hallux (pie) puede requerir, en algunos casos, más de tres meses de tratamiento. Se puede presentar recurrencia con el uso irregular o la suspensión del medicamento. La resolución completa de los signos y síntomas de la infección puede que no se produzca hasta varias semanas después del control micológico. La duración del tratamiento varía de acuerdo a la indicación y severidad de la infección.

TERBIX® Crema

Adultos y niños mayores de 12 años:

Duración y frecuencia del tratamiento:

Tinea pedis: Una vez al día durante una semana.

Tinea pedis tipo plantar: Dos veces al día durante 2 semanas.

Tinea cruris y tinea corporis: Una vez al día durante una semana.

Candidiasis cutánea: Una o dos veces al día durante 2 semanas.

Pitiriasis versicolor: Una o dos veces al día durante 2 semanas. El área afectada debe estar completamente limpia y seca antes de la aplicación de TERBIX® Crema. La crema se debe aplicar en una capa delgada sobre la piel afectada y área circundante y se debe frotar.

TERBIX® Solución

Debe aplicarse 1 ó 2 veces al día dependiendo de la indicación clínica.

La duración del tratamiento varía según la indicación y la gravedad de la infección. Infecciones cutáneas: Antes de aplicar la solución se deben limpiar y secar las superficies afectadas. Aplique una cantidad suficiente de solución en la piel afectada y distribuya uniformemente dando un ligero masaje. En caso de infecciones intertriginosas (submamarias, interdigitales, interglúteas e inguinales) la aplicación puede ser cubierta con una gasa especialmente en la noche. Duración probable del tratamiento: Tinea corporis, cruris: Aplicar 1 vez al día por 7 días (1 semana). Tinea pedis interdigital (pie de atleta): Aplicar 1 vez al día por 7 días (1 semana). *Pityriasis versicolor*: Aplicar, 2 veces al día, por 1 semana. Candidiasis cutánea: Aplicar 1 vez al día por 1 a 2 semanas. El efecto terapéutico de terbinafina solución tópica 1%, debe ser evaluado a las 2 - 7 semanas después de terminado el tratamiento prescrito.

El alivio de los síntomas clínicos tiene lugar en el lapso de pocos días. El uso irregular o suspensión prematura del tratamiento conlleva el riesgo de recurrencia.

PRESENTACIONES

TERBIX® Capletas: Caja con 50 capletas.

TERBIX® Crema: Tubo con 15 gramos.

TERBIX® Solución: Frasco gotero de 30 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.



Elaborado por:
Laboratorios Sued, S.R.L.
Carretera La Isabela,
Pantoja, Santo Domingo,
República Dominicana.
Apartado Postal 847
www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.:

TERBIX® Capletas: 2009-1221

TERBIX® Crema: 2009-0882

TERBIX® Solución: 2004-0330

©Marca registrada.